

## Kompressionsmassnahmen der Hände

### Lymphverband

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Indikation</b>       | Erste Kompressionsmöglichkeit bei noch fragilen Wundverhältnissen. Verband sollte über alle Wundareale gehen. Bei ödematösen Verhältnissen sollte die ganze Hand bandagiert werden. |
| <b>Wundverhältnisse</b> | Feuchte, offene Wunden  |
| <b>Wundauflagen</b>     | – Antiseptische Fettgazen (z.B. Bactigras) auf Wunden<br>– Bepanthen Plus + Fettgazen (z.B. Lomatuel/Mepitel) auf geschlossene/fragile Areale zur Verminderung der Friktion         |
| <b>Material</b>         | Elastische Mullbinden (z.B. Pehacrepp)  |
| <b>Tragedauer</b>       | 2 Tage  |

### Cobanverband

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Indikation</b>       | Durch die elastischen Kompressionsbandagen kann eine gleichmässige, verstärkte Kompression appliziert werden. Coban ist weniger atmungsaktiv als der Lymphverband. |
| <b>Wundverhältnisse</b> | Trockene, grösstenteils geschlossene Wunden  |
| <b>Wundauflagen</b>     | Gleiche Wundauflagen wie Lymphverband  |
| <b>Material</b>         | Cobanbandagen (z.B. Coflex)  |
| <b>Tragedauer</b>       | 2 bis 4 Tage   |

### Kompressionshandschuh

|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>Indikation</b> | Bei geschlossenen Wund- und stabilen Narbenverhältnissen wird ein Handschuh mit KK1 in Standardgrössen angeboten, bevor ein Masshandschuh angefertigt wird. |
| <b>Material</b>   | Juzo ScarPrime Seamless, KK1  |
| <b>Tragedauer</b> | 23 Stunden pro Tag  |

